

Terhesség és szoptatás alatti fájdalom és lázcsillapítás

Általános tudnivalók:

Orvossal megbeszélni!

Régi gyógyszerek használata, sok szakirodalom van, bevált hatóanyag – várandósokon nem lehet kísérletezni.

Aspirin származékok:

I-II trimeszterben és szoptatás alatt alkalmanként. III. trimeszterben nem szabad!
12 év alatt nem szabad adni!

Algopyrin származékok:

I trimeszterben és az utolsó 6 hétben csak orvosi javaslatra.
Többi időszakban lehet, szoptatás alatt alkalmanként.

Ibuprophen származékok:

Nurophen, Advil, Algoflex

I-II trimeszterben óvatosan

III. trimeszterben nem ! Botallo vezeték záródás veszélye miatt
Szoptatás alatt 3 hó után javasolt!

Paracetamol származékok:

Panadol, Qualerin

I trimeszterben nem!

III trimeszterben szinte csak ezt lehet szedni.
Szoptatás alatt is lehet.

Diclophenac származék:

Cataflam

I-II trimeszterben óvatosan, 1-1 szemet lehet de nem rendszeresen.

III trimeszterben kontraindikált.

Szoptatás alatt szedhető.

Koffein tartalmú szereket magas vérnyomásban szenvedők nem szedhetik.

Panadol extra, Quarelin

Antibioticumot rövid kúra /7nap/ Tetran és Summetrolim származék kivételével
mindent lehet!Recept kötelesek!